

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

# **АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА**



---

## АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА

При обнаружении необходимо срезать и уничтожать (сжечь) паутинные гнезда вредителя вместе с содержимым. На ранних стадиях развития насекомого такую проверку садовых деревьев нужно производить регулярно – не реже раза в неделю.

Между уничтожением гнезд даже при невысокой численности вредителя необходимо обрабатывать деревья соответствующими препаратами. В зависимости от массовости заражения, это могут быть:

Биологические пестициды (Битоксибациллин, Лепидоцид) с интервалом 7-8 дней.

Химические пестициды (Герольд) в период вегетации.

Также для борьбы с американской белой бабочкой допустимо применять разрешенные к использованию в частных хозяйствах пиретроиды (Алатар, Инта-Вир, Карбоцин, Кинмикс, Фатрин, Фьюри), вещества, проникающие через покровы насекомых, нарушая функционирование нервной системы, вызывая паралич и смерть.

Дата публикации: 10.09.2022

Теги: [Рос сельхоз надзор](#).

[-----](#)  
Копировать ссылку

[Предыдущая новость](#) [К списку новостей](#) [Следующая новость](#)